

Do nascimento à terceira idade

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS									
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICAS	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIEs*						
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO									
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento										Vacinar os não vacinados anteriormente													SIM	SIM	SIM					
Rotavírus		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.							CONTRAINDICADA																SIM	SIM	NÃO				
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)		Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)							SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa							
Haemophilus influenzae b		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco							SIM, três primeiras doses	SIM	SIM							
Poliomielite (vírus inativados)		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco							SIM, três primeiras doses	SIM	SIM							
Pneumocócicas conjugadas		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC10, VPC13 ou VPC15, iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	VPC10, VPC13 ou VPC15 - Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13 ou VPC15: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13 ou VPC15: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13								
Meningocócicas conjugadas		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO		Reforço aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de cinco anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC e menACWY								
Meningocócica B		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente - Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		NÃO	SIM	NÃO							
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)		CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																SIM	NÃO	NÃO											
Influenza (gripe)		VACINAÇÃO ANUAL																SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos	SIM, Tri ou Tetra-valente e HD4V (60 anos ou +)	SIM, Trivalente											
Febre amarela		Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.																SIM	SIM	NÃO											
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 59 anos	SIM	NÃO								
Varicela (catapora)		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM	SIM	SIM								
Hepatite A		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM								
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses		Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)				SIM, HPV4 duas doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM, HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais									
Pneumocócica 23 valente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco																Duas doses com intervalo de 5 anos		NÃO	SIM	SIM									
Herpes zóster		A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco																Rotina a partir dos 50 anos		NÃO	SIM	NÃO									
Dengue		QDenga* recomendada entre 4 e 60 anos independente de contato prévio com o vírus da dengue, duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia* recomendada entre 6 e 45 anos somente para soropositivos para dengue, três doses com intervalo de seis meses entre elas																NÃO	SIM	NÃO											
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19																														
VSR	Nirsevimabe - Dose única universal para < 1 ano na primeira sazonalidade.																										Arexvy® Uma dose, a qualquer momento, independente da sazonalidade.		NÃO	SIM	NÃO

● Rotina ● Vacinar não vacinados ○ Situações especiais ● Contraindicada



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIm

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunização - 2024



www.tecnocold.com.br

(11) 3861-5144 (11) 98615-9514